



5




Uw borsten kunnen wat gevoeliger worden door de behandeling. Soms groeien de borsten. Ook kunt u wat zwaarder worden.

5




Het kan moeilijker zijn een stijve penis te krijgen of te houden. Dat komt ook door het medicijn **H**.



NEDERLANDSE VERENIGING VOOR UROLOGIE


Prostaatkanker

1




De uroloog heeft uw prostaat onderzocht. U heeft prostaatkanker. De kanker is uitgezaaid.

2




Testosteron is een mannelijk hormoon. Dit hormoon wordt in de bijniere en ballen gemaakt. Testosteron **T** laat de tumor groeien.

3




Uit de hersenen komen seintjes om testosteron **T** te maken. U krijgt van ons andere hormonen **H** als medicijn. Deze hormonen **H** stoppen de seintjes vanuit de hersenen. Er wordt dan geen testosteron meer gemaakt en de tumor groeit niet verder.

4



Er zijn 3 manieren om testosteron te blokkeren: 1) een prik (in buik of been), 2) pillen of 3) een operatie. Bij de operatie haalt de uroloog de binnenkant van de ballen weg. Hierdoor worden de ballen iets kleiner en slapper.

5



Minder testosteron **T**? U kunt daardoor deze klachten krijgen: U kunt last hebben van opvliegers. Dat zijn aanvallen van warmte en zweten. En soms voelt u zich wat moe en minder sterk.